インフルエンザ予防接種予診票

任意接種用

		こご記入下さい 態をよく把握し	ている保護者がご言	己人下さ	い。診察	前の体	温	-0t	度	101	分
住 所		to a file	人はシンはませ	5/4/# 5/4/#	200 以脱氢的 不 人后下为	toe	TEL (95/Q)		C.
(フリガナ)	()	男	生年	明治・ブ	大正・昭和	· 平成 ·	令和
受ける人の氏名							土牛	年	E F	3	日生
(保護者の氏名)	氏名)			女			月日		(歳 ヵ月		カ月
質	問	事	項			答		欄		医師語	
1. 今日受ける 理解しました		ついて説明が	て(裏面)を読んで	いいえ		e I di	日本		はい		T
2. 今日受ける 1回目です?		エンザ予防接	種は今シーズン	いいえ 前回の	え()接種は() 0 E		=)	はい		
3. 今日、体に	具合の悪いところがありますか。			はい 具体的に()				いいえ	The second		
4. 現在、何かの	の病気で医	師にかかって	ていますか。	はい	病名()	いいえ		
		など)を受けて	いますか。	はい・	いいえ				25 IV		
・その病気の主治医には、 今日の予防接種を受けてもよいと言われましたか。					はい・いいえ					N.D.	
	最近 1 ヵ月以内に病気にかかりましたか。				はい 病名()					Jan 20	
6. これまでに ⁴ 血液疾患、1	. これまでに特別な病気(心臓血管系・腎臓・肝臓・血液疾患、免疫不全症、その他の病気)にかかり、医師の診察を受けましたか。)	いいえ		EW J
7. これまで間質	これまで間質性肺炎や気管支喘息等の呼吸器系疾患 はい()年()月頃と診断され、現在、治療中ですか。 (現在治療中・治療していない)						いいえ	EGL-C			
8. これまでにて りますか。	これまでにひきつけ(けいれん)を起こしたことがあ はい()回ぐらい りますか。						いいえ		5		
	薬や食品(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発しんやじん はいましんが出たり、体の具合が悪くなったことがあ 薬または食品の名前りますか。 ())	いいえ			
). 近親者に先天性免疫不全と診断された方がいますか。					AD LA RIES	9 , 0	PEN -Y	GF K#3	いいえ	CERT-I	
	. 1ヵ月以内に家族や周囲で麻しん、風しん、水痘、 おたふくかぜなどにかかった方がいますか。 病名()	いいえ			
2. 1ヵ月以内に予防接種を受けましたか。					はい 予防接種の種類()				いいえ	I	P.
3. これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことがありますか。					はい 予防接種名・症状 ()				いいえ		ē
14. (女性の方に	女性の方に)現在妊娠していますか。					はい					7
5. (接種を受けられる方がお子さんの場合) 分娩時、出生時、乳幼児健診などで異常がありましたか。 具体的に())	いいえ			
		ことで医師に 具体的に書い	伝えておきたい いて下さい。	5 7. 1	14年7月1		単立	Wish?			
	者)に対して	て、予防接種の変	果、今日の予防接種 効果、副反応及び医薬					智和	t記名押E 正起)	
			や目的、重篤な副原 を希望しますか。	え スプログラス	人の署名	(もしく	は保	護者の	署名)		
(接種を希望	望します・	接種を希望し	(ません)	()	※自署できない 代筆者氏名及				战。続柄	嬳	
使用ワ	カチン	名	用法・用量	Ē	実力	布場所			接種		
インフルエンザHAワクチン Lot. No.			皮下接種			易所:			尼崎市猪のクリ		
	1.		☑ 0.5mL (3歲L	以上)	医 師	名:		院長	孫野	直走	5
カルテNo.	No. 0.25mL(6ヵ月以.				接種年月	∃A:		TEL	(06)649 年	11-0567 月	7 E

インフルエンザワクチンの接種について

インフルエンザの予防接種を実施するに当たって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、表面の予診票に出来るだけ詳しくご記入下さい。お子さんの場合には、健康 状態をよく把握している保護者がご記入下さい。

[ワクチンの効果と副反応]

予防接種により、インフルエンザの発病を阻止したり、インフルエンザによる合併症や死亡などを予防することが期待されます。

一方、副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれる、小水疱、蜂巣炎などがみられることがあります。過敏症として、発しん、じんましん、湿疹、紅斑、多形紅斑、そう痒、血管浮腫、精神神経系として、頭痛、一過性の意識消失、めまい、顔面神経麻痺等の麻痺、末梢性ニューロパチー、失神・血管迷走神経反応、しびれ感、振戦、消化器として、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、筋・骨格系として、関節痛、筋肉痛、筋力低下があらわれることがあります(いずれも頻度不明)。その他に、発熱、悪寒、倦怠感、リンパ節腫脹、咳嗽、動悸、ぶどう膜炎があらわれることがあります。強い卵アレルギーのある方は、重篤な副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出て下さい。

非常にまれですが、次のような重篤な副反応が起こることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)脳炎・脳症、脊髄炎、視神経炎、(4)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(5)けいれん(熱性けいれんを含む)、(6)肝機能障害、黄疸、(7)喘息発作、(8)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(9)血管炎(IgA血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、白血球破砕性血管炎等)、(10)間質性肺炎、(11)皮腐粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、急性汎発性発疹性膿疱症、(12)ネフローゼ症候群、このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出て下さい。なお、健康被害(入院が必要な程度の疾病や障害など)が生じた場合については、健康被害を受けた人又は家族が独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づいて救済手続きを行うことになります。

[予防接種を受けることができない人]

- 1. 明らかに発熱のある人(37.5℃以上の人)
- 2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- 3. 過去にインフルエンザワクチンの接種を受けて、アナフィラキシーを起こしたことがある人 又は、過去にその他の原因でアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師にその 旨を伝えて判断を仰いで下さい。
- 4. その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した人

[予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人]

- 1. 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
- 2. 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
- 3. かぜなどの症状が出はじめたと思われる人
- 4. 予防接種を受けたときに、2日以内に発熱のみられた人及び発しん、じんましんなどのアレルギーを疑う異常がみられた人
- 5. 薬の投与又は食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発しんが出たり、体に異常をきたしたことのある人
- 6. これまでにひきつけ(けいれん)を起こしたことがある人
- 7. 過去に本人や近親者で検査によって免疫状態の異常を指摘されたことのある人
- 8. 妊娠している人
- 9. 間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患のある人

[ワクチン接種後の注意]

- 1. インフルエンザワクチンの接種を受けたあと30分間は、急な副反応が起きることがあります。接種した医療機関に留まるなどして、様子を観察し、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
- 2. 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 3. 接種当日はいつも通りの生活をしていただいてかまいません。ただし、激しい運動は避けましょう。
- 4. 万一、接種後、接種局所の異常反応や体調の変化があらわれた場合は、速やかに医師の診察を受けて下さい。

あなたの接種予定日	医療機関名				
月 日()です 当日は受付に 時 分頃 おこし下きい	医療法人社団 まごのクリニック				